肾衰竭 ★★☆（0~3题）

急性肾损伤

①肾前性（最常见）：大失血、液体丢失过多、肝硬化、心衰、机械通气等→有效循环血量↓
②肾性（如 ATN）：肾缺血、肾中毒、原尿外漏、肾小管阻塞
③肾后性：尿路梗阻

（2007、2008、2012、2016）

	肾前性 AKI	ATN
尿比重	＞ 1.018	＜ 1.012
尿渗透压	＞ 500	＜ 250
尿肌酐 / 血肌酐、血尿素氮 / 血肌酐	＞	＜
尿钠	＜ 10	＞ 20
钠排泄分数、肾衰指数	＜	＞
尿沉渣	透明管型	棕色颗粒管型

确诊：GFR（拟诊肾性 AKI 但不能明确病因需活检）

进展 / 维持期

高钾（主要死因）、高镁、高磷、低钙、低钠、低氯水中毒、代谢性酸中毒（2009、2016、2022）
“三高三低两中毒、贾玲美爱吃醋”

纠酸时注意防止游离钙降低所致手足抽搐（2018）

K^+ ＞ 6.5、pH ＜ 7.2
严重尿毒症（心包炎 / 脑病 / 癫痫）
利尿无效的严重肺水肿（呼吸困难）
（2020）