肾衰竭 ★★☆（0~3 题）

慢性肾衰竭

$K^+ > 6.5$、pH < 7.2
严重尿毒症（心包炎 / 脑病 / 癫痫）
利尿无效的严重肺水肿（呼吸困难）
（2020）

毒素：尿素氮（小）、PTH（中）、蛋白质（大）

慢性肾炎（我国最常见）、糖尿病肾病（欧美最常见）等病史
间断水肿、蛋白尿、高血压、贫血（EPO ↓）、出血（血小板功能减低）
最先出现消化系统表现，最主要死因是心衰

可能可能最可能（2009、2013、2016）

ACEI/ARB：血压< 130/80（若尿白蛋白 / 肌酐< 30 或透析：血压< 140/90）

治疗肾性贫血：EPO、罗沙司他（模拟 HIF“罗森的番茄沙司”）、铁、叶酸

限磷：不含钙的磷结合剂司维拉姆、碳酸镧

骨营养不良
（2015、2025）

- 高转化性骨病（最常见）——PTH 过高；骨质疏松、易骨折、骨骼囊样缺损、纤维囊性骨炎
- 低转化性骨病——①骨再生不良：PTH 相对偏低、成骨因子不足；②骨软化症：骨化三醇不足、铝中毒
- 混合性骨病

慢性肾脏病分期（2009）

	CKD1	CKD2/ 代偿期	CKD3/ 失代偿期	CKD4/ 肾衰期	CKD5/ 尿毒症期
GFR	⩾ 90	60~89	30~59	15~29	< 15 或透析
血 Cr		< 177	< 442	< 707	⩾ 707