内科含诊断 原发性肾小球疾病 ★★★（1~6题）

- 继发性
  - 急进性肾炎（2011）
    - Ⅰ型：肺出血 - 肾炎 Goodpasture 综合征
    - Ⅱ型：急性肾炎、SLE、过敏性紫癜
    - Ⅲ型：显微镜下多血管炎、Wegener 肉芽肿“自制三鲜肉”
  - 肾病综合征（2016、2024）
    - 儿童和青年多见
      - 过敏性紫癜：IgA 沉积为主，双下肢对称出血点（2019）
      - SLE：育龄期女性多见
      - 乙肝：膜性肾病最常见
    - 中老年多见
      - 骨髓瘤、淋巴瘤、糖尿病、淀粉样变性“遂宁糖粉”
- 概述
  - 金标准：穿刺活检（2010、2012、2015、2016、2019、2024、2025）
  - 容量依赖型高血压先利尿消肿降压（2020）
  - 针对蛋白尿 + 高血压：ACEI/ARB
  - 肾病综合征的并发症（2013、2021）
    - 血栓、栓塞（2007、2014、2015）
      - 膜性肾病肾静脉最常见
      - 突发腰痛 、血尿或蛋白尿加重、肾脏增大
      - 首选 B 超、最佳肾静脉造影
      - 白蛋白＜ 20 预防性抗凝、辅以抗板
    - 蛋白质及脂代谢紊乱
      - 肝代偿增加蛋白合成的能力＜丢失和分解
    - 感染
      - 无需预防性用抗生素
    - 急性肾损伤（少见）
      - 脂性肾病最常见
- IgA 肾病（2014、2015、2017、2019）
  - 肾小球源性血尿最常见的原因（2012、2013）
  - 青年多见，前驱感染 1~3 天后明显血尿
  - 多种病理类型、以系膜增生性肾炎最常见（2014）
  - ①单纯血尿（主要）：对症（不用激素 + 环磷酰胺）
  - ②伴蛋白尿和 / 或高血压：ACEI/ARB 尿蛋白＜ 0.5、若无效可给激素