中毒（1~3题）★★★

有机磷中毒

抑制胆碱酯酶（2008、2012、2015、2018、2019、2022、2025、2026）

	表现	胆碱酯酶活力“生我气喝农药”
轻度	仅M样症状“小桥流水慢悠悠” （心率↓、视物模糊、针尖样瞳孔、腹痛腹泻、大小便失禁、大汗流泪流涎、肺啰音等）	50%~70%
中度	M+N样症状（肌纤维颤动等）	30%~50%
重度	M+N样症状伴脑水肿、抽搐、昏迷、呼吸肌麻痹、肺水肿之一“恼hu了”	＜30%

治疗

迅速清除毒物和紧急复苏是关键：碳酸氢钠禁用于敌百虫、高锰酸钾禁用于对硫磷（2023）

解毒药

- 胆碱酯酶复活药：氯解磷定（恢复胆碱酯酶活性、缓解外周N样症状）“绿帽子喝农药”
- 中枢性抗胆碱药：东莨菪碱（缓解中枢症状）“中东”
- 外周性抗胆碱药：阿托品、山莨菪碱（缓解外周M样症状）

使用阿托品后（2007、2019）

- 阿托品化——瞳孔扩大、心率↑（90~100）、肺啰音消失、口干、无汗、颜面潮红“你是我的阿托品”
- 阿托品中毒“验尿中”——瞳孔明显扩大、尿潴留、中枢症状

①中间型综合征：中毒后约1~4天，胆碱酯酶＜30%（胆碱酯酶复活药用量不足）“易中天”

②迟发性多发神经病：症状消失后约2~3周，胆碱酯酶活力正常、神经靶酯酶异常“周星驰把妹1234”