胃癌（0~1题）★☆☆

- 病理
  - 好发于胃窦小弯侧，主要为腺癌
  - 早期（2014、2015、2016、2021）
    - 未侵犯肌层、无论有无局部淋巴结转移 —— 一点癌、微小癌（≤ 5mm“威武”）、小胃癌（6~10mm“小时”）
    - ＜ 2cm、无溃疡的分化型黏膜内癌→内镜下胃黏膜剥离术（首选）或切除术 + 定期胃镜随访“小二分手内心无愧”（2024）
  - Borrmann 分型“一肿二三溃四弥漫” ——
    - Ⅰ息肉 / 肿块型（边界清楚）
    - Ⅱ溃疡局限型（边界清楚）
    - Ⅲ溃疡浸润型（最常见）
    - Ⅳ弥漫浸润型（可致皮革胃预后最差，2014、2016）
  - 淋巴转移最早最常见，恶性程度高者跳跃式或晚期易至左锁骨上淋巴结的 Virchow（2012）
    晚期血道转移最常至肝→牛眼征（2009）
    种植性转移：尤其印戒细胞癌转移至双侧卵巢（Krukenberg 瘤）
- 中老年、腹痛、体重减轻
  - 内镜：首选、金标准
  - 大便隐血试验筛查：可持续阳性
- D2 淋巴结清扫的根治性手术（2024）
  - 全胃切除术、远端 / 近端胃大部分切除术等
  - 胃切断线距肿瘤边缘＞ 5cm，位于两端的癌切除食管下端或十二指肠 1 部的 3~4cm“无端生事”