

★☆☆ 肠梗阻（0~2题）
主要病因和治疗
腹部手术、损伤或炎症史：粘连性肠梗阻（最常见，2010）
先保守治疗
≤ 2 岁多见：肠套叠（2023）
腹痛、腹部肿块、果酱样血便
钡灌肠（兼治疗作用）弹簧或杯口状“2 岁弹杯子装的果酱”；＞ 2 天手术为主
痛吐胀停（2025）
可能可能最可能
腹痛
阵发性绞痛→机械性
持续性胀痛或不适→麻痹性
呕吐
呕吐早而频繁、可合并代碱→高位（空肠）
呕吐较晚、含粪样物→回肠
呕吐不明显→大肠
腹胀
腹胀不明显、可见胃型、X 线鱼骨刺状→高位（空肠）
腹胀明显、可见胃肠型、X 线阶梯状液气平→低位（回肠、大肠）
腹胀均匀对称→麻痹性
排便排气
停止→完全性
尚有→不完全性
肠鸣音（正常 4~5 次 / 分）
肠鸣音增强→机械性（亢进呈金属音调，2010）、痉挛性
肠鸣音减弱→麻痹性
治疗
最基本
禁食补液、胃肠减压
手术
已绞窄（2008、2011、2021、2026）
持续腹痛伴阵发加剧，压痛固定
腹痛可暂时减轻、随后出现腹膜炎
早期休克
血性呕吐物、排泄物、腹水
X 线孤立固定的肿大肠袢（不随时间变化）
易绞窄
急性完全性梗阻
肠套叠
闭袢性梗阻
急性完全性输入袢梗阻
逆行性嵌顿疝
大肠完全梗阻
结肠 - 结肠型套叠
肠扭转（2008）
①青年饱餐后剧烈运动多致小肠扭转
回转复位扭转肠袢
若坏死：肠切除 + 一期吻合术
②便秘的老年运动多致乙状结肠扭转
钡灌肠（兼治疗作用）鸟嘴征（2010、2013）
回转复位扭转肠袢
若坏死：肠切除 + 造口
有心脏疾患老年
房颤等→栓塞肠系膜上动脉等→急腹症（症征不符）：腹腔动脉造影（2019、2023、2026）