手外伤、股骨头坏死、膝关节损伤、神经损伤

★☆☆（0~2题）

- 手外伤
  - 清创后一期（6~8小时内）修复血管、神经、肌腱、骨组织（2010）
  - 断肢 / 指再植 —— 6~8 小时内（断指可延长至 12~24 小时），无药敷料密封干燥冷藏
- 股骨头无菌性坏死
  - 外伤损伤旋股内侧动脉的分支髂外侧动脉，如股骨颈骨折、髋关节脱位（2021）
  - 糖皮质激素、乙醇、减压 / 沉箱 / 潜水员病（氮气栓塞）、镰状细胞贫血，多为双侧
  - 髋关节活动受限、腹股沟区深压痛、4 字试验
  - X 线（8 周）“约 - 硬 - 头塌 - 头脱” ——
    - Ⅰ软骨下溶解期：新月征→髓芯减压术等
    - Ⅱ股骨头修复期：硬化带
    - Ⅲ股骨头塌陷期：头塌陷
    - Ⅳ股骨头脱位期：Shenton 线不连续、关节间隙变窄、髋臼骨赘形成→全髋关节置换术
  - 早期诊断 —— 核素、MRI“核磁”
- 膝关节韧带和半月板损伤
  - 半月板损伤的要素：膝半屈等（2020）
  - 半月板桶柄状撕裂：穿过半月板全层的纵行撕裂
    Donoghue 三联征：前交叉韧带断裂 + 内侧副韧带损伤 + 内侧半月板损伤
  - 试验（2014、2018） ——
    - 研磨 /Apley、旋转挤压 /McMurray“麦旋风”、过伸过屈、蹲走：半月板“广播体操”
    - 研磨 /Apley、侧方应力：侧副韧带“扮演伏地魔”
    - Lachman、抽屉：交叉韧带“拉抽屉”
    - 轴移：前交叉韧带断裂后出现的膝关节不稳定“以前很轴”
  - 首选MRI，金标准关节镜（2012）