骨肿瘤 ★★★（0~4 题）
确诊金标准：活检（2011、2026）
乳腺癌（最常见）、前列腺癌、甲状腺癌、肺癌、肾癌等怀疑骨转移：多至躯干、椎弓根和椎体骨质破坏 + 椎间隙正常（2019、2020）
核素 ECT（但特异性低）→其他影像学（脊髓受累用 MRI）→ CT 引导活检（2011）

	性质	好发人群	好发部位	影像特点	主要治疗	备注
骨软骨瘤（2020）	良性	青少年	长骨干骺端	向外的杵 / 疣状突起 与正常骨皮质连续、髓腔相通	多无须治疗（2020）	最常见的原发性骨肿瘤 查体所见肿块较 X 线显示大
骨巨细胞瘤（2008、2018）	交界性（2011）	20~40 岁	长骨骨端、椎体	偏心性膨胀性的肥皂泡样改变（2012） 无骨膜反应（2023）	①分期较早：局部切除 + 灭活 ②分期较晚：根治性切除，化疗无效（2009） ③发生在脊椎：放化疗（但放疗易肉瘤变，2023）	局部包块压之有乒乓球样感 “肥皂剧、打乒乓”
骨肉瘤（2016、2024、2026）	恶性	青少年	长骨干骺端 （股骨下端 / 胫骨上端等）	形成瘤骨（碱性磷酸酶↑，2024） 骨膜反应（Codman 三角和日光射线，2007、2024）	化疗 + 根治性手术 + 化疗（2009、2016、2026） 易转移至肺：术前拍胸片等→可能手术切除转移灶（2016）	最常见的原发性恶性骨肿瘤（2013） “Cod 三角日光线、手术放在化疗间”
尤因肉瘤	恶性	儿童	长骨骨干、骨盆、肩胛骨	骨膜反应（葱皮 / 板层 / 同心圆样，2012）	放疗（极敏感）+ 化疗 + 手术 “幼儿园儿童喜欢吃三种口味的葱油饼、多放葱”	常伴低热、血 WBC 和血沉↑ （需与骨髓炎鉴别 - 高热）
软骨瘤	良性（2010）		手足短管状骨“又短又软”	边界清楚、斑点状钙化	手术	
软骨肉瘤	恶性		骨盆“盆装肉软骨”	边界不清、斑点状钙化	手术	
淋巴瘤	恶性	中老年		溶冰征“冰柠檬”	化疗 + 放疗，手术为辅	
脊索瘤	恶性		颅底、骶尾椎“上下求索”		手术	
骨瘤	良性		颅骨	病灶隆起于骨面“头上长犄角”	手术	
骨样骨瘤	良性（2010）		下肢长骨（2024）	低密度小瘤巢和周围硬化反应骨“小样还痛啊”	手术	可夜间痛（给 NSAIDs）
骨囊肿（2025）	肿瘤样病变	儿童青少年	长骨干骺端	类圆形边界清楚	刮除（但＜ 14 岁→甲泼尼龙注入囊腔）	
动脉瘤性骨囊肿（2025）	肿瘤样病变		长骨干骺端	骨性间隔将囊腔分成蜂窝状或泡沫状	手术	
骨纤维异常增殖症	肿瘤样病变			累及股骨近段者似牧羊人手杖	手术	