躯干骨骨折&脊髓损伤 ★★☆（0~3题）

脊柱骨折概述

- 好发于T10-L2“012”。成人L1以下骨折不会损伤脊髓(2007)
- 诊断脊髓、神经、韧带、半月板等损伤首选MRI“软软的”（2014、2018）
- 脊柱骨折急救搬运：平托法、滚动法（2018）

颈椎骨折

	屈曲型（2016）	垂直压缩型	无骨折-脱位的过伸损伤	缢死者骨折（过伸损伤）	齿状突骨折	寰-枢椎脱位
		Jefferson骨折“嬛嬛减肥”（C1前后弓骨折）	Whiplash挥鞭损伤等	Hangman骨折“二叔上吊”（C2椎弓根骨折）		
不手术	压缩＜1/3支具固定	Halo架或牵引固定		无移位Halo架或牵引固定	Ⅰ、Ⅲ、无移位Ⅱ型Halo架固定	
手术	压缩＞1/3、或脱位		扩大椎管容积	有移位	有移位的Ⅱ型	寰枢椎融合术

Chance骨折

经椎体、椎弓、棘突的横向撕裂性骨折“切水果连切-偶然”

骨盆骨折

- 骨盆分离试验与挤压试验阳性、双下肢不等长、会阴部瘀斑(耻骨和坐骨骨折的特征)
- 并发症：失血性休克、后尿道尤其膜部、膀胱、直肠、坐骨神经等损伤（2015、2021）

脊髓损伤

脊髓震荡

最轻微、可恢复

不完全脊髓损伤（2025）

①前脊髓综合征：最严重，下肢瘫痪重于上肢“钱↓最严重”
②后脊髓综合征：运动、痛温觉存在，而本体感觉障碍“后-深”
③脊髓中央管周围综合征：没有感觉分离，上肢瘫痪重于下肢“中央-上级、不分离”
④脊髓半切B-S综合征：同侧运动、本体感觉障碍，而对侧痛温觉障碍“一同运动感情深、对面感情浅”

完全脊髓损伤（2008、2014、2018）

- 脊休克2~4周后软瘫变硬瘫(肌张力增高、腱反射亢进、病理征阳性)
- C1-C4：四肢硬瘫
  C5-T1：上肢软瘫、下肢硬瘫
  T2-L1：上肢正常、下肢硬瘫
  L2-S3：上肢正常、下肢软瘫

脊髓圆锥、马尾神经损伤

- 会阴部/鞍区感觉障碍、括约肌功能丧失(二便失禁)
- 脊髓圆锥损伤运动正常，而马尾神经损伤运动障碍(软瘫)

并发症（2008、2009、2022）

坠积性肺炎、呼吸道感染、呼吸衰竭、尿潴留、泌尿生殖道感染和结石、压疮、自主神经功能紊乱（高热）
“想象肺肾脊柱两边、往外压、往内热”

治疗

- 6~8小时是黄金时期：甲泼尼龙、高压氧疗
- 手术指征：脊柱骨折-脱位、脊柱骨折复位不满意、碎骨片突入椎管、椎管内有活动性出血“拖布入血”（2008、2014）