- 骨折概论 ★★★（0~2题）
  - 治疗
    - 复位
      - 标准 —— 旋转、成角、分离移位必须完全矫正，否则致畸形愈合“选成分”
长骨干横形骨折：骨折端对位≥ 1/3、干骺端≥ 3/4
缩短移位：成人下肢≤ 1cm、儿童下肢≤ 2cm“1234、成人矮了不接受”
      - 一般先手法复位
      - 切开复位指征“老开旧功能内部多处嵌入和损伤”（2009、2010、2023） —— 老年人四肢骨折需尽早离床活动
开放性骨折、陈旧骨折不愈合
手法复位未达功能复位（关节内、前臂和小腿双骨折未达解剖复位）
关节内骨折、不稳定骨折、多处骨折
骨折断端间有肌肉等软组织嵌入
并发主要血管、神经、韧带损伤，脊髓损伤
    - 固定
    - 功能锻炼 —— 在不影响固定的情况下尽早功能锻炼（2016）
  - 早期并发症“休克脂栓脏器损骨筋膜室综合征”（2022）
    - 休克（2023） —— 骨盆骨折、股骨干骨折、髋关节中心脱位等
    - 脂肪栓塞 —— 成人股骨骨折、骨盆骨折等
    - 组织损伤
    - 骨筋膜室综合征（2007、2019、2020、2023）
      - 前臂掌侧（伸直型肱骨髁上骨折、前臂双骨折等）
小腿背侧（胫骨中上 1/3 骨折等）
      - 高度肿胀、5P 综合征（疼痛或转为无痛）→立即切开减压（否则缺血性肌挛缩）
  - 晚期并发症（2026）
    - 主要与长期卧床有关 —— 关节僵硬、下肢深静脉血栓形成、坠积性肺炎、压疮
    - 感染（可致化脓性骨髓炎）
    - 创伤性骨化性肌炎（2013） —— 关节外骨折如肘关节肱骨髁上骨折
    - 创伤性关节炎 —— 关节内骨折如肱骨头、肱骨髁、尺骨鹰嘴、桡骨头、Barton、髋臼、髌骨、胫骨平台、踝部（2010）
    - 急性骨萎缩 —— 手、足骨折等，交感神经性骨营养不良（疼痛、血管舒缩紊乱、骨质疏松）“十指连心”
    - 缺血性骨坏死（2013） —— 股骨颈骨折、舟月骨骨折等
    - Volkmann 缺血性肌挛缩（最严重） —— 骨筋膜室综合征外固定过紧等处理不当，五指爪形手 / 足、坏疽、急性肾衰