输血（0~1题）☆☆☆

- 自体输血（2009）
  - 禁忌症：胸腹腔开放性损伤＞ 4 小时
  - ①回收式：外伤性脾破裂（不是肝破裂）、异位妊娠破裂等（2017）
    ②稀释式
    ③预存式：HCT ≥ 30%
- 失血量（2008、2020）
  - ＜ 10%（500ml）：不输血
  - 10%~20%（500~1000ml）：晶体液、胶体液
  - 20%~30%（1000~1500ml）：晶体液、胶体液、浓缩红
  - ＞ 30%（＞ 1500ml）：晶体液、胶体液、1/2 浓缩红、1/2 全血“三全凌汤圆”
- 血制品
  - 浓缩红（最常用）——最适合心功能不全等
  - 洗涤红“洗过肾更健康”——①去除抗体如 IgA：最适合 IgA 低下者（易过敏）
    ②含无功能白细胞和血小板：多次输血、经产妇
    ③含少量血浆：肾功能不全
  - 少 / 去白红——最适合多次输血、经产妇、预期需反复输血“翻白眼”
  - 辐照红（灭活淋巴细胞）——准备移植者为预防 GVHD“伊芙琳”
  - 冷沉淀——纤维蛋白原缺乏症、甲型血友病（遗传缺乏凝血因子 8）“你冷 8 冷”