★★☆ 烧伤（0~2题）

烧伤面积（2009）

- 3、3、3（发、面、颈）
- 5、6、7（双手、双前臂、双上臂）
- 13、13、会阴 1（躯干前、躯干后、会阴）
- 5、7、13、21（双臀、双足、双小腿、双大腿）→成年女性更改为 6、6、13、21

烧伤深度“Ⅰ浅Ⅱ疱Ⅲ全层、红红白白”（2008、2010、2015、2016）

	Ⅰ度	浅Ⅱ度	深Ⅱ度	Ⅲ度
损伤	表皮浅层	部分表皮生发层或真皮乳头层 “发如雪”	部分真皮网状层	皮肤全层甚至皮下 脂肪、肌肉、骨骼、内脏
创面	红斑状 干燥、无水疱	湿润、红润 大小不一的水疱	湿润、红白相间 可有小水疱	蜡白焦黄、炭化、树枝状栓塞血管 干燥、无水疱
感觉	烧灼感	疼痛显著、感觉过敏	温度↓、痛觉迟钝	发凉、痛觉消失
愈合	＜1周	10天~2周	3~4周，瘢痕增生	需植皮，瘢痕增生

低血容量性休克（2009、2019）

每1%的Ⅱ、Ⅲ度烧伤面积、每kg体重补1.5ml（晶：胶=2：1（广泛深度烧伤时1：1））+2000ml葡萄糖溶液

↓

前8h输入一半，后16h输入另一半
（晶体/电解质如平衡盐、胶体如血浆）