★☆☆ 麻醉（0~2题）

全身麻醉（2007、2008、2010、2013）

- 吸入麻醉药
  - ①氧化亚氮：禁用于肠梗阻“笑破肚子”
  - ②地氟烷：适合心脏手术“心地善良”
  - ③七氟烷：呛咳屏气发生率低、可降血压“七里香”
- 静脉麻醉药
  - ①依托咪酯：适合心脏手术“衣脱心动”
  - ②氯胺酮：小儿基础麻醉常用，镇痛强，适合休克、哮喘。可致幻觉噩梦、升高颅压 / 眼压 / 血压
  - ③异丙酚 / 丙泊酚、咪达唑仑、右旋美托咪定
- 肌松药（无麻醉作用）
  - 竞争性（非去极化）
    - 筒箭毒碱、维库溴铵（适合心肌缺血“维护心脏”）
    - 新斯的明有效
  - 非竞争性（去极化）
    - 琥珀胆碱：肌松出现前有肌纤维收缩
    - 新斯的明无效

局部麻醉

“咏麻：酯类普丁胆碱解、其余酰胺少过敏，普卡安全不表麻、丁卡表麻毒性大
利多全能慎腰麻、神经阻滞起效快，罗哌尤适硬膜外、分娩镇痛萝卜拔”

①普鲁卡因毒性最小“普通 - 安全 - 逊”，适合局部浸润麻醉，不适合表面麻醉（2014）
②丁卡因毒性最强，适合表面麻醉“钉子”，不适合局部浸润麻醉
③罗哌卡因、布比卡因适合分娩镇痛（2014）

- 一次限量（2024）
  - 利多卡因表面 100、神经和局部浸润 400，丁卡因表面 40、神经 80，罗哌卡因和布比卡因 150，普鲁卡因 1000
  - “和李医师钉死吧、摇我萝卜 1000 次”

神经阻滞

	颈丛	臂丛肌间沟径路	臂丛锁骨上径路	肋间
易致高位硬膜外阻滞、全脊髓麻醉	√	√		
易致膈神经 / 喉返神经 / 颈交感神经麻痹	√	√	√	
易致气胸			√	√