其他外科总论 ☆☆☆（0~1题）

- 灭菌（杀灭芽孢）“蒸、煮、泡、低温料理、烧烤、微波炉”
  - 高压蒸汽（最常用）：有效期 2 周
  - 化学气体（环氧乙烷、过氧化氢、甲醛）：不耐高温（仪器、导管、内镜“胰岛内分泌”）（2012）
  - 煮沸持续 1 小时：耐高温（金属器械、玻璃、橡胶）
  - 戊二醛等化学药液浸泡 10 小时：锐利器械、内镜
  - 干热 / 火烧：玻璃、粉剂、油剂
  - 电离辐射（γ 射线）
- 创伤
  - 止血带 —— 适合加压包扎无法止血的四肢大出血，禁用细绳、电线
每隔 1 小时放松 1~2 分钟、使用不超过 4 小时
  - 开放伤清创 —— 伤后 6~8 小时内清创后一期缝合（但火器伤清创后不一期缝合）
- 移植（2018） —— 移植中疗效最显著：肾（慢性排斥反应是最大障碍）
排斥反应发生率最高、易并发严重感染、易发生 GVHD：小肠
- 微创 —— 腹腔镜手术可有与 CO_2 气腹相关的并发症
- 肿瘤（2011）
  - 预防（2012） —— 一级预防（对因）：防止癌症发生（戒烟、疫苗等）
二级预防：高危人群定期筛查、早发现早诊断早治疗
三级预防：姑息、对症治疗
  - ①皮肤基底细胞癌：生长缓慢、很少转移，伴黑色素增多者破溃后呈鼠咬状，对放疗敏感“放老鼠药”
②交界痣：在基底细胞层（易恶变），警惕手掌 / 足底 / 皮带区痣恶变（出血、破溃、色素加深、变大、瘙痒、疼痛）（2009）
③皮脂腺囊肿：好发于头面和背部，表面有小黑点、囊内有豆渣物（2015）