血浆脂蛋白 ★☆☆（0~2题）

- 载脂蛋白 apo
  - 作为转运脂类的载体（但游离脂肪酸靠白 / 清蛋白转运，2013）
  - 作为脂类交换的连接蛋白
  - 作为脂类受体的识别标志 —— apoA Ⅰ识别 HDL 受体“高寿的阿姨会养猫”
apoB100、apoE 识别 LDL 受体“bell”
  - 作为脂类代谢酶的调节剂 —— apoA Ⅰ激活 LCAT →促进胆固醇在血浆酯化
apoC Ⅱ激活脂蛋白脂肪酶
- 脂蛋白的降解
  - HDL —— 将胆固醇逆向转运到肝内降解
  - LDL —— 2/3 经多种细胞（肝为主）的 LDL 受体降解（2012）
1/3 经巨噬细胞和血管内皮细胞的清道夫受体降解（2015）
  - VLDL、CM —— 经脂蛋白脂肪酶降解

蛋白质含量：HDL > LDL > VLDL > CM
脂肪含量：CM > VLDL > LDL > HDL
胆固醇含量：LDL > HDL > VLDL > CM“两盒 VC”（2001）

	乳糜微粒 CM（特征 apoB48）	极低密度脂蛋白 VLDL/ 前 β	低密度脂蛋白 LDL/β	高密度脂蛋白 HDL/α
合成（2002、2012、2016）	小肠	肝	血浆 VLDL → IDL → LDL	小肠、肝、血浆“肠肝循环”
作用（1997、2002、2012、2013、2020）	运输外源性脂肪、胆固醇	主要运输内源性脂肪 “very 肥”	运输内源性胆固醇	将胆固醇逆向转运到肝内降解 “好的脂蛋白”
疾病	↑→高脂血症	↑→高脂血症 ↓→脂肪肝（2008）	↑→高脂血症（最重要）	↓→高脂血症