随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

消化道除了口腔,食管,肛门外其他地方都不是鳞状上皮,如胃、肠道是腺上皮

（2）腺上皮化生 一种细胞→另一种细胞

假幽门腺化生	小肠是主要的吸收部位
肠上皮化生（常见） 可有不典型/异型增生→可能癌变 增生的细胞跟原来的细胞相比出现差异 不典型增生/异型增生见于:肿瘤、某些癌前病变	完全型/小肠型/I型：含有杯状、吸收、潘氏细胞 不完全型/II型：含有杯状细胞 ①胃型/IIa 型 ②结肠型/IIb 型→可能导致肠型胃癌 大 2B


化生:慢支炎→支气管假复层纤毛柱状上皮鳞状化生　先存在肠上皮细胞化生,在此基础上发生胃癌

（3）A 型 VS B 型胃炎

G→胃泌素↑→壁细胞→HCl↓

胃泌素对胃酸促进作用↓,但促进胃酸分泌的因素不只胃泌素,所以胃酸正常或↓

	A 型胃炎	B 型胃炎（常见）
病因	自身免疫	Hp（常伴消化性溃疡）
抗壁细胞和内因子抗体	+	-
好发部位	壁细胞存在胃体 胃体、胃底	G细胞在胃窦幽门部 胃窦
胃酸分泌	明显↓（缺乏）	正常或↓
血胃泌素	负反馈↑	G细胞受损↓
血 $VitB_{12}$	↓（常伴恶性贫血）	正常



内因子帮助VitB12在回肠吸收

多种原因→VitB12/叶酸缺乏→巨幼贫

由内因子↓→VitB12↓→巨幼贫→恶性贫血

胃酸减少→巨幼贫

内因子→VitB12

HCl

胰蛋白酶


少量胃酸就可以使VitB12从食物中放出来,所以胃酸减少不会导致巨幼贫

二、消化性溃疡

1.病因：**Hp**，防御屏障↓和侵袭因素↑等 天平失衡

	胃溃疡	十二指肠溃疡（常见）
好发年龄	中老年 小老 dou 老胃病	青壮年
好发部位	胃窦小弯侧	球部前壁

小凯笔记自行整理



胃窦小弯又叫角切迹,应力改变更明显




图 11-2 幽门螺杆菌

沃森 - 斯塔里银染色（Warthin-Starry 银染色）示幽门螺杆菌呈黑色弯曲棒状（箭头），黏附于胃黏膜（胃小凹）表面，细胞核为黑色。

好发于球部前壁原因:


①十二指肠球部最靠近胃窦部,容易遭受HP的破坏

②胃酸直接进入十二指肠球部,加上前壁是游离的,非常薄

壁细胞数量决定胃酸最大分泌量

十二指肠溃疡患者壁细胞数量比正常人多,产生的胃酸也多

2.并发症



①出血：最常见

与溃疡好发部位一致

②穿孔：胃溃疡好发于胃小弯、十二指肠溃疡好发于球部前壁

③幽门狭窄 溃疡出现肉芽组织纤维性修复,胶原纤维一收缩→幽门梗阻

④癌变：胃溃疡癌变率多＜1%（来自溃疡边缘）；十二指肠溃疡几乎不癌变

做胃镜时从溃疡边缘取活检