
（4）**亚大块及大块坏死**

①累及大部分或整个肝小叶（>肝实质 2/3 为大块、1/2-2/3 之间为亚大块），导致**网状纤维支架塌陷**

撑着肝细胞的支架

②见于**重型肝炎**




点状坏死

碎片状坏死（界板）

桥接坏死

亚大块及大块坏死（网状支架塌陷）



不是大量嗜酸性粒细胞浸润　本质

3.**嗜酸性变和嗜酸性坏死**：**凋亡**（形成**嗜酸性小体/Councilman body**）

脱水胞质浓缩

找规律：凋亡大部分是生理情况

记特殊：凋亡出现于病理情况—病毒性肝炎

凋亡：主动的程序性死亡，"自杀"

坏死：被动性的死亡，"他杀"

4.**脂肪变性**

①最多见于**丙肝、丁肝**

HE染色脂肪被洗掉，成空泡

②肝细胞胞浆出现球形脂滴（**空泡或苏丹III阳性**）。当肝细胞胞质内出现很多小脂滴泡、但尚未挤压细胞核时称为微泡型脂肪变；当胞质内被一个大脂滴泡所占据、**将细胞核挤压至一侧**时称为**大泡型脂肪变**

注意：病毒性肝炎没有脂肪坏死。脂肪坏死见于急性①重型胰腺炎、女性②乳房创伤

特殊的液化性坏死

（二）渗出和增生

病毒感染

1.渗出：主要为**淋巴细胞和单核细胞**浸润（林丹）VS 淋浆：慢性胃炎

2.增生

①肝细胞：再生的肝细胞体积较大、核大深染、有时可见双核（不是异型增生），邻近肝细胞可通过再生沿网状支架修复；若坏死严重导致网状支架塌陷、再生的肝细胞呈**结节状再生（再生结节）**细胞没有撑着它的东西