随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

专题串联·消化系统恶性肿瘤概述

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）肿瘤的异型性

肿瘤组织与其来源的**正常组织存在差异**：异型性**大**→分化程度**低**→恶性度**高**

①结构异型性：组织结构在**空间排列**方式不同

②细胞异型性：通常细胞体积异常和多形性，核大和多形性，核深染，核仁大而明显，**核分裂象多**，可有**病理性核分裂象**（如不对称核分裂）

癌组织长得快，DNA丰富

肝硬化是癌前病变，但是假小叶内无异性增生的肝细胞




图6-2　正常鳞状上皮和鳞状细胞原位癌的比较

食管的正常鳞状上皮（左图）和鳞状细胞原位癌（右图）的比较。注意后者的结构异型性和细胞异型性均很显著，包括极性紊乱，核大、深染，核质比例增高，核分裂增多

（二）癌的转移

①抓规律：**癌最早最常见多为淋巴转移**

②记特殊：**绒癌、肝细胞癌 HCC、甲状腺滤泡癌、肺腺癌最早最常见为血道转移**

没有肿瘤间质、血管，直接泡在母体血管里面

先泡水溶 C

（三）消化系统恶性肿瘤的病理类型

1.中晚期大体/肉眼类型

（基本类型均为蕈伞、溃疡、浸润）

蕈伞　溃疡　浸润

浸润：纤维少（软软的）：髓质型；纤维多（又硬还会收缩）：缩窄/硬化型

食管癌	溃疡型、蕈伞/隆起型、髓质型（**最多见**）、缩窄/硬化型 （浸润包括纤维组织少的髓质型-软软的、纤维组织多的缩窄型-硬硬的）
胃癌	溃疡型（**最多见**）、息肉/蕈伞/结节蕈伞型、浸润型（可致革囊胃）没有隆起型（是早期胃癌）
大肠癌	溃疡型（**最多见**）、隆起/息肉/蕈伞型、浸润型
肝细胞癌	单结节型、多结节型（**最多见**）、弥漫型、巨块型

