
（2）组织学类型

①**鳞癌最多见**

②**腺癌：多来自 Barrett 食管**（食管下部的鳞状上皮被柱状上皮取代——**腺上皮化生**，多见于**胃食管反流病**，是食管腺癌的癌前病变，需**定期接受胃镜复查**）

在病理学中当成腺上皮也行

组胚中柱状上皮概念比腺上皮概念更大





柱状上皮薄，血管会显露出来，红彤彤

目前学过的腺上皮化生
- 慢性萎缩性胃炎
  - 假幽门腺上皮
  - 肠上皮化生
- Barrett食管

二、胃癌

1.好发于**胃窦小弯**侧

胃癌与幽门螺杆菌息息相关，幽门螺杆菌在幽门附近，所以胃窦小弯是好发部位

2.危险因素

①异型/不典型增生（如胃溃疡伴异型增生）

胃溃疡癌变率<1%，但若有异型增生，癌变率会大大增加

②Hp 感染、亚硝胺、慢性萎缩性胃炎特别是伴结肠型不完全肠化（与肠型胃癌密切相关）、胃腺瘤性息肉

大2B

①胃腺癌
②慢性萎缩性胃炎→肠化→胃癌（胃的柱状上皮和肠的柱状上皮不一样）

3.早期胃癌

①肿瘤累及黏膜层、黏膜下层，但**没有侵犯肌层**，**无论有无**淋巴结转移，包括原位癌、黏膜内癌、黏膜下癌

只能有局部淋巴转移

②类型：凹陷型/溃疡周边癌性糜烂（最多见）、隆起型、表浅型

溃疡型

胃溃疡癌变容易从边缘开始

③**早期胃癌的特殊类型**：微小癌（≤5mm 威武）、小胃癌（6-10mm 小时）、一点癌

一点癌：活检发现肿瘤，做手术时切下来标本没有发现肿瘤，取活检时已经取掉了

4.中晚期胃癌

（1）大体类型

①**溃疡型（最多见）**

②**息肉/蕈伞/结节蕈伞型**（这里就不要说隆起型了、因为隆起型是早期胃癌的类型之一）

③**浸润型**：局限性或弥漫性浸润，若为弥漫性浸润可致**革囊胃/皮革胃（预后最差）**

胃壁完全被浸润+纤维收缩