三、大肠癌

1.肿瘤只有突破黏膜肌层**到达黏膜下层**才称为癌，否则称为**上皮内瘤变**

原位癌、黏膜内癌预后好,定义成癌容易过度治疗




图 11-14　家族性腺瘤性息肉病

2.好发于**直肠壶腹部**、其次在**乙状结肠**

3.癌前病变

息肉病	①家族性/遗传性腺瘤性息肉病 FAP：未经治疗 **100%**癌变 ②增生性息肉**病**、幼年性息肉**病**　xx息肉❌ ③**色素沉着黑斑息肉综合征 Peutz-Jeghers** ④**肠息肉病合并多发性骨瘤和软组织瘤 Gardner** Gu-骨 ⑤胶质瘤息肉病综合征 Turcot 桃胶
腺瘤	管状腺瘤最常见、**绒毛状腺瘤易癌变**惹毛了就癌变、混合型腺瘤、息肉状腺瘤
其它	慢性**血吸虫**病、**溃疡性结肠炎**（克罗恩病也可）炎症性肠病:克罗恩病、溃疡性结肠炎



4.中晚期大肠癌 不讨论早期

（1）大体类型（左亲右拢溃疡多）

①**溃疡型**（**最多见**，因直肠癌以溃疡型最多见）

②**隆起/息肉/蕈伞型**（多分化较高）：**右**侧结肠癌隆起型多见，**腹部肿块和全身症状（低热/贫血/消瘦）多见**


肿瘤会消耗机体,会有一些免疫反应


③**浸润型**：**左**侧结肠癌浸润型多见，**肠梗阻（大便细）和便血多见** 离肛门近

肠道越到肛门越细,加之肿瘤浸润,水分少(被吸收)→容易发生肠梗阻,大便变细

癌容易出现坏死出血,但是便血跟出血的位置有关,如右侧结肠离肛门远,出血被稀释

注意：胶样型在 10 版教材 P219 已删除





胃鳞癌(在贲门部)

（2）组织学类型：**腺癌（最多见）**、鳞癌（直肠肛门附近）

组织学类型中的黏液腺癌/胶样癌在大肠癌中预后最差（黏液胶样预后差）

胃癌预后最差:弥漫性浸润导致革囊胃/皮革胃