一般规律:癌转移最早最常见:淋巴转移

5.转移：**胃肠道癌晚期血道转移至肝可有牛眼征**

外面一圈明显强化(血供丰富),越靠近里面就越黑(血供差,缺血坏死)



6.与大肠癌密切相关的基因（尤其 ***APC、KRAS、TP53***）ARDS

①原癌基因：*c-MYC*、*RAS*、*BRAF* RMB

吉尔救RAS咳咳咳

②抑癌基因：*p53*、*p16*、***APC*（遗传性腺瘤性息肉病）**、*DCC*、*MCC*、*DPC*（墨督督 app）

③**错配修复基因：*MLH* 和 *MSH*（遗传性非息肉病性大肠癌/Lynch 林奇综合征）**

非错不可霉死了




图 11-15　结直肠黏膜上皮逐步癌变的分子生物学基础

7.Dukes 分期 了解




图 11-16　结直肠癌 Dukes 分期示意图

A 期，肿瘤局限于黏膜层；B_1 期，肿瘤未穿透肌层，无淋巴结转移；B_2 期，肿瘤穿透肌层，但无淋巴结转移；C_1 期，肿瘤未穿透肌层，但有淋巴结转移；C_2 期，肿瘤穿透肠壁，并有淋巴结转移；D 期，有远处转移。

肿瘤只有突破黏膜肌层到达黏膜下层才称为癌,否则称为上皮内瘤变

A：黏膜内癌，无淋巴结转移（100%）

B_1：未穿透肌层，无淋巴结转移（67%）

B_2：穿透肠壁，无淋巴结转移（54%）

C_1：未穿透肌层，有淋巴结转移（43%）

C_2：穿透肠壁，有淋巴结转移（22%）

D：肝、肺、骨、皮肤的远处转移（存活率极低）

真题解析 • 消化道肿瘤

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点