随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

# 核心精讲·风湿病

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

## 一、风湿病是与A组β（乙）型溶血性链球菌感染有关的变态反应疾病

阿姨　不是感染性疾病

链球菌中的M蛋白抗原与人心瓣膜等组织存在交叉抗原性（交叉免疫反应）

由于心瓣膜上有类似抗原，所以针对M蛋白抗原的抗体也会攻击心瓣膜（变态反应疾病）

## 二、风湿病的特征是Aschoff小体

变质：变性（可逆）；坏死（不可逆）

1.**变质渗出期**：**黏液样变性**、**纤维素样坏死**、浆液和纤维素渗出等

风到这里就是黏　胶原纤维坏死

胃溃疡分成了四层：炎性渗出层、坏死组织层（纤维素样坏死）、肉芽组织层、瘢痕组织层

2.**增生期/肉芽肿期** 干扰：肉芽组织：成纤维细胞产生胶原纤维完成纤维性修复/纤维化；肉芽肿：单核巨噬细胞的增生性炎

①**最有诊断意义：Aschoff小体/风湿小体/风湿肉芽肿**。Aschoff小体由聚集在**纤维素样坏死灶**的成群**风湿细胞**、少量淋巴细胞（主要是**T**细胞）和浆细胞构成

单核巨噬细胞吞噬胶原纤维坏死物→风湿细胞增生

②风湿细胞由增生的**巨噬**细胞**吞噬纤维素样坏死物**后转变而来

③风湿细胞体积大、核大、核膜清晰、染色质集中于中央、核周可见明显的亮晕，核的横切面似**枭眼状**（o像眼）、纵切面似ttsx **毛虫状**（ff像毛虫），有时可见**多个核的Aschoff巨细胞**





图9-21　风湿性心肌炎

A. 低倍；B. 高倍。

3.纤维化期/硬化期：风湿细胞转变为成纤维细胞→风湿小体机化形成**梭形小瘢痕**

肉芽组织取代…

产生胶原纤维

取代风湿小体

## 三、风湿病可累及全身结缔组织的胶原纤维

### （一）风湿性心脏病

1.风湿性**心内膜炎（最严重）**

累及心内膜就是累及心瓣膜