（二）风湿性关节炎


1.病变呈游走性、反复发作

2.对比

	风湿	类风湿
炎症类型	慢性**肉芽肿**（特殊增生性炎）	慢性**非特异增生**性炎 浸润细胞"淋浆"
变态反应	II/细胞毒型 2 个字	III/免疫复合物/血管炎型 3 个字
主要侵犯	**大**关节（膝、肩关节等）	**小关节（腕、掌指、近端指间关节等）**
关节腔主要渗出	**浆液**二大爷（易被完全吸收）→不会遗留关节畸形	**纤维素**（不易被完全吸收）
关节畸形	**不**（舔过关节咬住心脏）	**常（天鹅颈样、纽扣花样等畸形）**

风湿病最严重的病变:风湿性心内膜炎

（三）皮肤病变（有诊断意义）

环形红斑	皮下结节
渗出性病变（没有 Aschoff 小体）见于增生期	增生性病变
 Aschoff小体是风湿病的基本病变,但并不代表所有病变都有	

（四）风湿性动脉炎

小动脉受累较常见，血管壁发生纤维素样坏死等

（五）风湿性脑病

①脑的风湿性动脉炎和皮质下脑炎

②累及锥体外系可引起**小舞蹈病**（肢体不自主运动）

舞蹈病:新纹状体GABA能神经元病变,对黑质多巴胺能神经元抑制↓导致肌张力↓,随意运动↑,呈现不自主的舞蹈样运动

真题解析·风湿病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点