随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有




图 9-18　高血压病脑出血
内囊、基底节区脑组织被血凝块代替。

5.左心室的病变

①代偿：向心性肥大（心室壁增厚、心腔相对缩小）

②失代偿：离心性肥大（心腔扩张、心肌收缩力降低）



图 9-15　高血压病左心室向心性肥大
心脏横断面示左心室壁增厚，乳头肌显著增粗，心腔相对较小。

6.视网膜的病变：视神经乳头水肿、出血

多见于青少年

二、急进型/恶性高血压

1.特征

①坏死性细动脉炎：细动脉纤维素样坏死（纤维蛋白样坏死）VS 缓进型高血压:有细动脉玻璃样变性,胶原纤维有一定硬度,没有受损,无纤维素样坏死

②增生性小动脉硬化：胶原纤维增多致血管壁呈层状洋葱皮/同心圆样增厚




图 9-19　恶性高血压
增生性小动脉硬化，血管壁呈同心圆状增厚，管腔狭窄。

胶原纤维坏死病因	部位	原因
胃溃疡	坏死组织层	
风湿病	结缔组织	免疫原因如变态反应
急进性高血压	血管壁	机械性原因血压又急又高直接冲烂胶原纤维

2.最易累及肾入球动脉，病变可波及肾小球致毛细血管袢节段性坏死，较早出现肾衰竭并发尿毒症 VS 缓进型高血压最主要死亡原因是脑出血

急进型高血压最主要死亡原因