随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

易混

①动脉粥样硬化中
问纤维帽/纤维斑块的形成不回答肉芽组织
因为纤维斑块的形成靠的是SMC产生胶原纤维
而不是肉芽组织中的成纤维细胞产生胶原纤维
但动脉粥样硬化可以观察到肉芽组织
>SMC与肉芽组织可以共存

②风湿病
形成阿绍夫小体(单核巨噬细胞吞噬纤维素样坏死后聚集)是肉芽肿
同时也能看见肉芽组织,取代风湿小体形成梭形小瘢痕
>肉芽组织与肉芽肿可以共存




图 9-4　动脉粥样硬化

表层为纤维帽,其下可见散在的泡沫细胞,深层为一些坏死物质、沉积的脂质和胆固醇结晶裂隙。




图 9-1　动脉粥样硬化发病机制示意图

低密度脂蛋白(LDL)通过内皮细胞渗入内皮下间隙,单核细胞迁入内膜;氧化 LDL(ox-LDL)与巨噬细胞表面的清道夫受体结合而被摄取,形成巨噬细胞源性泡沫细胞;动脉中膜的平滑肌细胞(SMC)经内弹力膜窗孔迁入内膜,吞噬脂质形成肌源性泡沫细胞;SMC 增生迁移,合成细胞外基质,形成纤维帽;ox-LDL 使泡沫细胞坏死崩解,形成糜粥样坏死物,粥样斑块形成。

三、AS 斑块的继发改变

①斑块内出血 斑块里面血管破裂





图 9-5　斑块内出血

A—血管腔;B—出血(箭头示)。

斑块内血管破裂,形成血肿,致管腔进一步狭窄。



破裂后遗留的缺损

②斑块（纤维帽）破裂形成溃疡



1.内皮下胶原暴露,容易导致血栓形成
2.斑块下内容物溢出 e.g 胆固醇栓塞