
斑块对血管平滑肌中膜压迫,导致平滑肌损伤,血流冲击下局部出现局限性瘤样扩张

③**动脉瘤（中膜平滑肌病变）**VS 血管瘤：由血管组织异常增生形成的良性肿瘤或血管畸形



动脉瘤怕
1.局部涡流导致血栓形成
2.动脉瘤破裂出血

④**营养不良性钙化**

吸引血小板凝血因子

⑤**血栓形成**：斑块破裂致内皮下胶原暴露、斑块破裂表面形成溃疡致血液形成涡流、动脉瘤致血液形成涡流

纤维帽
胆固醇

⑥动脉狭窄、出血、栓塞（血栓栓子、ttsx胆固醇栓子等）、梗死

大A-弹性动脉(弹性纤维)
中A-肌性动脉(平滑肌最丰富),如冠状A


四、AS 好发于中、大动脉




1.累及**冠状动脉（属于中动脉）最严重** 引起心绞痛、心肌梗死
直接受左心室(压力高)搏动冲击

①以**左前降支**最常见，尤其在**心壁**侧

②导致冠状动脉粥样硬化性心脏病（冠心病最常见类型），可出现心绞痛、心肌梗死








图 9-7　冠状动脉粥样硬化(大体观)
箭头示冠状动脉管壁增厚,管腔狭窄。




图 9-8　冠状动脉粥样硬化(Ⅲ级)
内膜不规则增厚,粥样斑块形成。

