梗死灶成什么颜色,取决于梗死灶内有无大量红细胞[有大量红细胞,叫出血性梗死 / 无大量红细胞,叫贫血性梗死]

③心肌梗死的病理变化：梗死灶呈苍白色（贫血性梗死）；心肌细胞/纤维早期凝固性坏死，核固缩、碎裂、溶解消失，胞质均质红染或不规则粗颗粒状（收缩带），心肌细胞间质水肿、中性粒细胞浸润；4 天后梗死灶外围出现充血出血带；1-2 周梗死边缘区域开始出现肉芽组织（不是肉芽肿）、其向梗死灶内长入（呈红色）；3 周后肉芽组织开始机化、逐渐形成瘢痕组织（6-8 周瘢痕愈合-陈旧性心梗）

坏死后细胞核一般变化　常见于结构致密的器官　本质是心肌挂掉,钙回收出问题,出现异常收缩




图 9-9　心肌梗死(收缩带)
心肌纤维凝固性坏死，核固缩，胞质均质红染，大量收缩带形成。




图 9-10　心肌梗死
心肌细胞间大量的中性粒细胞浸润。

2.累及主动脉

分支开口处血液血流物理现象发生变化,易对血管壁发生冲击

①主要累及主动脉的后壁及分支开口处（腹主动脉最严重）腹主动脉>胸主A>主A弓>升主A：越下越严重

腹主动脉瘤往往较大





图 9-6　腹主动脉瘤
腹主动脉壁局部向外明显扩张。



②若升主动脉粥样硬化①可累及瓣膜致纤维化和钙化，导致主动脉瓣狭窄；②也可累及瓣环致扩张，导致主动脉瓣关闭不全



3.累及颈动脉：以颈内动脉起始处最常见

分叉

4.累及脑动脉

①以大脑中动脉、基底动脉、Willis 环最常见大鸡娃

②可致脑萎缩、脑梗死（脑软化/液化性坏死）、脑出血

脑的磷脂丰富,所以是液化性坏死



图 9-13　大脑基底动脉粥样硬化
箭头示动脉粥样硬化斑块。

小凯助记图

