随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

5.累及肾动脉：以开口处及主动脉近侧端最常见，导致动脉粥样硬化性**固缩肾（大瘢痕肾）**肾伯伯竟主动开口

累及相对大的大动脉中动脉-累及肾A开口,缺血范围大,坏死范围很大形成的瘢痕也大

6.累及四肢动脉：以下肢动脉最常见

重力原因

7.累及肠系膜动脉：可导致肠道缺血坏死（绞窄性肠梗阻）

真题解析·动脉粥样硬化

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2014N50 A 与动脉粥样斑块表面的纤维帽形成关系密切的细胞是

A.平滑肌细胞
B.内皮细胞
C.单核细胞
D.成纤维细胞

2.2015N50 A 早期动脉粥样硬化病变的主要细胞是

A.成纤维细胞　脂纹:泡沫细胞
B.平滑肌细胞
C.泡沫细胞
D.内皮细胞

3.2016N49 A 动脉粥样硬化对人体危害最大的动脉类型是

A.大动脉
B.中动脉
C.小动脉
D.细动脉

以题带动
知识点复习

4.2019N37 A 脑动脉粥样硬化病变最常累及的部位是

A.小脑
B.丘脑
C.脑桥
D.大脑基底核

5.2020N34 A 急性透壁性心肌梗死患者 3 周后死亡，解剖时梗死灶内的主要表现是

A.心肌细胞出现核固缩
B.心肌细胞出现核碎裂　已经核溶解

答案：1-5 A C B D D