（四）限制型心肌病 舒张功能障碍为主

①**心内膜及心内膜下心肌纤维化**（纤维性增厚），以心尖部为重，**酷似缩窄性心包炎**

（缩心炎外套太紧、限心病内衣太紧）

②心室腔狭窄，心室充盈受限和舒张期容量减少

（五）致心律失常性右室心肌病（幼稚）

右心室心肌被**脂肪**组织或纤维脂肪组织进行性替代→**右**心室进行性扩大、难治性右心衰




图 9-29　致心律失常性右室心肌病
右心室局部被脂肪组织所替代。



（六）克山病（缺硒）

①两侧心腔扩大，心室壁变薄，以心尖部为重，心脏呈球形（类似扩心病）

②心肌严重变性（水肿、空泡变性、脂肪变性）、坏死、瘢痕形成

注意：上述心肌病均可有**房室瓣关闭不全**、心衰、栓塞（**附壁血栓**脱落）、猝死（肥厚型心肌病最常见）

①心腔扩大后门框变大，但是门没有变大（相对性关闭不全）
②肥心病关闭不全是因为漏斗效应，收缩期时血通过狭窄的流出道速度快，压强低，把二尖瓣吸引过来，收缩期二尖瓣本来应该是关闭的，此时却因为负压被吸引过来导致关闭不全

二、心肌炎

（一）病毒性心肌炎

1.相关病毒：**柯萨奇 B 组（最常见）**、柯萨奇 A 组、埃可、腺、流感、风疹、巨细胞、肝炎病毒等

《内科学》：柯萨奇 B 组（最常见）、埃可、脊髓灰质炎、腺、流感、细小、冠状病毒等