


（全腺泡型肺气肿：累及整个肺腺泡）

北欧青年常见

（2）间质性肺气肿（机制：空气进入肺间质）

①病因：肋骨骨折、胸部穿透伤、剧烈咳嗽（外伤和内伤）

②特点：串珠状气泡，**皮下气肿**

注意：胸膜下肺大泡破裂导致自发性气胸，因此肺气肿可以导致气胸。气胸不会引起阻塞性肺气肿，但张力性气胸可致间质性肺气肿

《生理》2020N138 X 当发生气胸时，对机体功能活动的危害有

A.阻碍静脉和淋巴回流

B.吸气阻力增大

C.呼气阻力增大

D.引起肺气肿　　D 选项不严谨

（3）其它类型肺气肿

①代偿性肺气肿：肺部病变或肺叶切除后残余肺泡的代偿性充气

②老年性肺气肿：老年人肺弹性回缩力减弱使肺残气增多

③**瘢痕旁**肺气肿（**不规则**肺气肿）：瘢痕附近的肺泡等破裂、融合形成的**局限**性肺气肿，出现的位置不恒定、大小形态不一



需注意：

瘢痕旁/不规则肺气肿	**腺泡周围型/间隔旁型**肺气肿
瘢痕牵拉（胶原纤维收缩）	
属于**其它类型**肺气肿	属于**肺泡性/阻塞性**肺气肿（但与阻塞无关）
累及肺腺泡的结构**不定** 主要累及肺泡	累及腺泡**远端的所有结构（肺泡管/肺泡囊）** **即腺泡远端肺气肿**