（2）右心室为主

①诊断病理形态标准：肺动脉瓣下 2cm 处右心室前壁肌层厚度超过 5mm 收缩能力增强,对抗增加的后负荷

②心脏重量增加、肺动脉圆锥显著膨隆、乳头肌和肉柱显著增粗、室上嵴增厚、室壁肥厚、心腔扩张、外观钝圆，心肌细胞/纤维肥大、萎缩、损伤，间质纤维化（胶原纤维增生）内在逻辑：右心室变强 不可能一直变强,一定会失代偿挂掉

心肌细胞是永久细胞,不可再生,发生损伤后由肉芽组织修复





图 10-11　肺气肿和慢性肺源性心脏病

A. 腺泡中央型肺气肿：呼吸性支气管呈囊状扩张；B. 肺气肿、肺源性心脏病：肺显著膨大，边缘钝圆，色苍白，有肺大疱形成，右心肥大，心尖钝圆。

真题解析·慢支炎、肺气肿、肺心病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点



1. 2014N52 A 慢性肺源性心脏病心脏变化的主要指标是

A.肺动脉瓣下 2cm 处右心室壁厚度超过 0.5cm

B.心脏重量增加可达 850g

C.左心室肥厚

D.三尖瓣关闭不全

2. 2015N52 A 腺泡周围型肺气肿的病理表现是

A.呼吸性细支气管不扩张，其周围的肺泡扩张

B.呼吸性细支气管扩张，周围肺泡扩张不明显 腺泡中央型

C.肺泡间隔内出现成串小气泡 间质型肺气肿

D.呼吸性细支气管、肺泡管和肺泡囊均扩张 全腺泡型

