
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

二、大叶性肺炎



1.**肺炎链球菌**等多见，好发于**青壮年** 青壮年淋雨后抵抗力下降
大叶性肺炎约等于肺炎链球菌肺炎

2.**肺泡的纤维素性炎（累及肺泡）**

①**实变**：指肺泡内浆液、纤维素、细胞等渗出，肺泡气体消失，病变经肺泡间孔（Cohn孔）或呼吸性细支气管在肺段蔓延，常致部分或整个肺大叶受累；而肺大叶之间的蔓延则是经肺叶支气管播散所致
一般不会跨过肺叶(有叶间裂)

②**支气管不受累**，胸膜多受累

③纤维素性炎：**以纤维素（纤维蛋白）渗出为主的炎**



图 10-1　大叶性肺炎
病变肺叶肿胀，色灰黄，质实如肝。





图 10-2　大叶性肺炎(灰色肝样变期)
肺泡腔内充满渗出的纤维蛋白及中性粒细胞，箭头示相邻的肺泡腔内纤维蛋白经肺泡间孔互相连接。



eg. ①心包腔渗出纤维素却不容易溶解吸收→被肉芽组织取代机化→缩窄性心包炎
②类风湿的关节腔里主要渗出纤维素(不易溶解吸收)→遗留关节畸形;风湿的关节腔里主要渗出浆液(易吸收)→不会遗留关节畸形

3.并发症（少见）
肺炎链球菌荚膜致病,不产生毒素,不导致组织坏死
①**肺肉质变/机化性肺炎（最常见）**：由于肺泡内渗出的**中性粒细胞**数量过少或功能缺陷→释放的蛋白酶不足以使渗出的纤维素完全溶解吸收→未被溶解吸收的纤维素会被**肉芽组织**取代（机化）→病变肺组织呈褐色 ttsx 肉样外观

②胸膜肥厚和粘连 肺泡炎症累及胸膜→胸膜腔有纤维素渗出→没有被完全溶解吸收,被肉芽组织取代(机化)

③肺脓肿和脓胸 大叶性肺炎有不同细菌混合感染(如肺炎链球菌和金葡菌)

④最严重：感染中毒性休克、败血症 感染性疾病最严重的并发症

三、小叶性/支气管肺炎

糖尿病患者容易出现金葡菌感染
1.肺炎链球菌、金葡菌等多见，好发于久病卧床者、ttsx 老年人、婴幼儿、体**弱**者 抵抗力差
大叶性肺炎:一型,二型,三型,七型肺炎链球菌(更常见)
小叶性肺炎:四型,六型,十型肺炎链球菌(少见)　内科学:肺炎链球菌感染→大叶性肺炎

2.小叶性肺炎常是某些疾病（**麻疹后/术后/吸入性/坠积性肺炎等**）的并发症（最细码数）
麻疹/百日咳引起小叶性肺炎/支气管肺炎→化脓性感染,破坏支气管壁→段、小支气管壁失去支撑结构→支扩