

3.桥本 VS 亚甲炎

慢性淋巴细胞性/自身免疫性甲状腺炎/桥本	亚急性/肉芽肿性/巨细胞性甲状腺炎
免疫介导	病毒感染 炎症感染
甲状腺双侧弥漫性肿大（对称）	甲状腺不对称、结节状肿大
无痛	痛
质韧，与周围组织无粘连	常与周围组织粘连
广泛滤泡被破坏、萎缩 经典甲减	部分滤泡被破坏、胶质外溢，异物巨细胞 肉芽肿 结核有干酪样肉芽肿 类似结核结节肉芽肿（但无干酪样坏死）
伴大量淋巴细胞和不等量的嗜酸性粒细胞浸润，淋巴滤泡 慢性萎缩性胃炎 慢性丙肝	伴多量中性粒细胞和不等量的嗜酸性粒细胞、淋巴细胞、浆细胞浸润，微小脓肿
	

分离现象（摄碘率↓但T3T4↑BMR↑类似甲亢）

4.结甲和甲状腺腺瘤均可有囊性变、出血等继发性改变：

ttsx	结节性甲状腺肿	甲状腺腺瘤
结节数量	常多发、常累及双侧	常单发、常累及单侧
结节包膜	不完整	完整
滤泡大小	不一致	较一致
邻近甲状腺组织	无受挤压	受挤压



图 15-11 甲状腺腺瘤
腺瘤呈卵圆形，包膜完整，分界清楚。

抓规律:良性肿瘤一般都有包膜
记特殊:子宫平滑肌瘤虽然是良性,但是没有包膜

甲状腺痛:亚甲炎、结甲囊内出血,腺瘤囊内出血
甲状腺一般不痛:结甲、Graves病、桥本

小结：

	机制	甲状腺肿大	甲功
单纯性/弥漫性非毒性甲状腺肿	缺碘致内分泌 增生超过原有限度 病理性增生	早期：双侧弥漫性肿大（对称） 后期：少数变为结甲（不对称）	
弥漫性毒性甲状腺肿（Graves 病）	免疫介导	双侧弥漫性肿大（对称） 常伴突眼	甲亢
慢性淋巴细胞性/自身免疫性甲状腺炎/桥本	免疫介导 TPOAb	双侧弥漫性肿大（对称）	甲减
亚急性/肉芽肿性/巨细胞性甲状腺炎	病毒感染	不对称肿大、压痛	可致甲减 早期分离现象