二、类风湿关节炎

类风湿性关节炎——慢性增生性滑膜炎
风湿性关节炎———浆液性炎(多为急性)
骨性关节炎———关节软骨退行性病变

1.风湿 VS 类风湿


ttsx	病变呈游走性风湿	病变呈多发性对称性类风湿
炎症类型	慢性**肉芽肿**（特殊**增生**性炎）	慢性**非特异增生**性炎
变态反应	II/细胞毒型 2 个字	III/免疫复合物/血管炎型 3 个字
主要侵犯	大关节（膝、肩关节等）	**小关节**（**腕、掌指、近端指间关节**等）
关节腔主要渗出	**浆液**（易被完全吸收）	**纤维素**（不易被完全吸收）被肉芽组织取代机化
关节畸形	**不** 舔过关节咬住心脏 风湿性心内膜炎最严重	**常** 重力原因导致容易向小拇指偏斜 （**天鹅颈样**、**纽扣花样**、手关节**尺**侧偏斜）
皮肤特征	**环形红斑**、皮下结节	类风湿结节/皮下结节

渗出性病变
没有Aschoff小体



一般规律:抗体都是IgG
特殊:IgM目前见于RF、ABO血型天然抗体 温哥华天天吃冷面

2.类风湿因子 RF（Ig**M**）：此抗体相关的抗原为 IgG 的 Fc 片段



3.病理变化

CD4T淋巴细胞浸润是规律
还见于慢性萎缩性胃炎、慢性丙肝、桥本


①**CD4 T 淋巴细胞为主**、浆细胞、巨噬细胞浸润，淋巴滤泡

慢性非特异的增生性炎

②病变**始于滑膜**，**滑膜细胞增生肥大**、形成绒毛状突起

③**新生血管、血管翳**（高度血管化+炎细胞浸润+增生状态的滑膜覆盖在关节软骨表面）

④随着血管翳逐渐向心性伸展和覆盖整个**关节软骨**致其严重**破坏**，最终血管翳充满关节腔、发生纤维化和钙化、引起永久性关节强直



风湿、类风湿均有胶原纤维坏死

4.类风湿小结：中央为大片**纤维素（纤维蛋白）样坏死**，周围有呈栅栏状或放射状排列的上皮样细胞，外围为肉芽组织（肉包皮蛋）

有上皮样细胞不一定是肉芽肿

