免疫缺陷综合征包括原发性和获得性

三、获得性/继发性免疫缺陷综合征 AIDS（艾滋病）获得性更常见

VS CD8T细胞是细胞毒性T细胞　HIV大量复制

1.HIV 感染 **CD4 T 细胞/辅助 T（主要）**、**单核-巨噬细胞（储备池）**、**滤泡树突状细胞（储备池）**、**神经系统**（4 叔单身没有 B）。HIV 进入 CD4 T 细胞的机制与 HIV 的 gp120 结合 CD4 受体、CXCR4、CCR5 有关

不能感染B淋巴细胞




图 5-4　HIV-1 结构模式图




图 5-5　HIV 感染发病机制示意图
TNF—肿瘤坏死因子；IL-6—白细胞介素 -6；CXCR4—cxc- 趋化因子受体 4；CCR5—趋化因子受体 5。

本质还是血液传播

2.传播途径：性、血、母婴、医务人员职业传播。HIV 主要存在的体液有血液、精液、子宫分泌物、阴道分泌物、乳汁 没有唾液、泪液、消化液、尿液、汗液

3.病理变化早期生机勃勃、晚期一片荒芜

①**早期淋巴结肿大**、淋巴滤泡明显**增生**

②**晚期淋巴细胞几乎消失殆尽**，仅残留少许巨噬细胞和浆细胞，血管和纤维组织增生。有时可见大量分枝杆菌、真菌等（却**很少见到肉芽肿**）肉芽肿体现机体抗感染消灭细菌,有免疫力 HIV患者没有免疫力所以肉芽肿少见

③脾大是 AIDS 患者的常见体征，脾的显著病变是淋巴细胞高度耗竭、仅有少量白髓、甚至完全消失。成人 AIDS 胸腺无明显病变、可出现滤泡增生；儿童 AIDS 胸腺过早退化

胸腺青春期才退化

4.完全型艾滋病饿死机体

①抗 HIV 抗体阳性

②CD4 T 细胞显著↓

③**多发机会性感染**：以中枢神经系统、肺、消化道受累最常见

孢子虫

70%**孢子菌肺炎**；中枢以新隐球菌、弓形虫、**巨细胞病毒 CMV**（多见）、人乳头瘤病毒 HPV 多见（报废批新工具）

④恶性肿瘤：30%卡波西 **Kaposi 肉瘤**，其它常见伴发肿瘤为**淋巴瘤**