2.病因：**人乳头瘤病毒 HPV** 尤其 **16、18** 型

抑癌基因(基因组卫士)

①HPV 编码的 E_6 蛋白使 ***p53*** 失活、E_7 蛋白使 ***RB*** 失活（5678）

②免疫组化 p16 弥漫强阳性可辅助诊断 HSIL（p16 蛋白是高危型 HPV 基因表达的指标）

16、18型HPV基本上引起的都是高级别

3.**鳞**癌最常见 宫颈与摩擦有关

4.好发于**鳞-柱状上皮交界处（移行带）**。若 HPV 感染原始的鳞-柱状上皮交界处则与化生无关；若 HPV 感染新的鳞-柱状上皮交界处则与化生有关

慢性宫颈炎柱状上皮异位到宫颈阴道部,由于不耐受酸性环境发生鳞化而形成

5.最早和最常见扩散：淋巴转移（最早转移至子宫旁淋巴结）和直接蔓延

6.临床分期（**0 期-原位癌**）

I	癌局限于子宫颈内 ①早期/微小浸润癌：浸润深度≤基底膜下 **5**mm ②浸润癌：浸润深度＞基底膜下 5mm
II	癌进入盆腔、但未累及盆腔壁；癌侵及阴道、但未累及阴道下 1/3
III	癌侵及盆腔壁、阴道下 1/3（阴字偏旁像 3；删我）
IV	癌已超越骨盆、或累及膀胱或直肠

