随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（一）葡萄胎 VS 绒癌

	良性葡萄胎（完全性、部分性）	交界性恶性葡萄胎（侵袭性葡萄胎）	绒毛膜癌/绒癌（多继发于完全性葡萄胎）
两种滋养层细胞			
合体滋养层细胞增生 细胞滋养层细胞增生	√	比 良性葡萄胎 显著	比 侵袭性葡萄胎 显著
程度不同 滋养层细胞 异型增生、坏死出血	轻度		
间质	间质水肿 血管消失		无间质和血管 血管消失 ❌ 绒癌无血管、那怎么获取营养啊？不用你操心，绒癌侵袭宿主血管、直接泡在母体血管，是最易血道转移的癌
绒毛	√	√	× 恶性程度高 （异型性大-分化低） 三无产品：鱼香肉丝没有鱼、老婆饼没有老婆 ttsx 绒毛是正常结构 绒癌无绒毛 说明与正常结构差别大
侵犯子宫肌层和或血管	×	√（水泡状绒毛侵入子宫肌层）	√ 癌细胞直接侵入子宫肌层 （但无水泡状绒毛）
阴道蓝紫色结节	×	√	√
转移	×	几乎× 交界性-生物学行为介于良恶性之间	√ 侵犯子宫静脉-压力低 血道转移：肺最常见→咯血 原发灶切除后转移灶可自行消退 恶性肿瘤最大特点-转移 淋巴转移 ❌
主要治疗	彻底清宫	化疗	化疗

注意：阴道蓝紫色结节 原理不同

①绒癌：经血管转移至阴道致阴道出血坏死

②侵袭性葡萄胎：绒毛入血作为栓子、经血管至阴道造成栓塞致阴道出血坏死（绒毛无法继续生长）转移:癌细胞入血后在另外一个地方继续生长



图 14-12　子宫绒毛膜癌
癌组织位于子宫底部，呈暗紫红色，结节状，可见出血坏死。




图 14-13　绒毛膜癌
由细胞滋养层和合体滋养层两种瘤细胞组成，细胞异型性明显，肿瘤内无间质和血管。