（二）葡萄胎

风湿病

1.胎盘绒毛因间质高度**水肿**、**黏液样变性**而增大，呈葡萄状，称为水泡状胎块（无血管-透明），绒毛**间质内血管消失**、或有少量无功能毛细血管（内无红细胞），**滋养层细胞异型增生**（风到这里就是粘、粘住过客的葡萄。这节课后你将失去对巧克力/葡萄/橘子的兴趣）






图 14-10 葡萄胎
子宫体积增大，子宫腔内充满大小不等的透明水泡。






图 14-11 完全性葡萄胎
胎盘绒毛显著肿大，间质水肿，血管消失，滋养层细胞明显增生。

2.完全性 VS 部分性葡萄胎

完全性葡萄胎完全 2 个字	部分性葡萄胎不完全 3 个字
所有绒毛呈葡萄状	部分绒毛呈葡萄状
①主要：一个精子 23X 结合缺乏染色体的空卵精子自我复制翻倍 ②两个精子（23X 或 23Y）结合缺乏染色体的空卵少见	①一个双倍体精子 46XY 结合染色体数量正常的卵细胞 23X 精子自我复制翻倍 ②两个精子（23X 或 23Y）结合染色体数量正常的卵细胞 23X
双倍体核型：46XX（主要）、46XY	三倍体核型：69XXX、69XXY、69XYY
染色体全部来自父亲	染色体来自父母双方
无胎儿组织	可有胎儿组织
无 p57 核染色	有 p57 核染色

P57是正常核染色现象





卵子染色体数量正常