（三）胎盘部位滋养细胞肿瘤（恶性）

胎盘内分泌功能：①hCG ②人绒毛膜促生长激素/人胎盘催乳素 ③雌激素 ④孕激素

①多数人胎盘催乳素 hPL+、少数 hCG+


②**单一**的中间型滋养细胞（VS 绒癌为两种细胞）


③无绒毛，可侵犯肌层、可转移

④一般无明显出血、坏死 VS 绒癌

四、卵巢肿瘤

卵泡包括中央的卵母细胞（实质）和周围的卵泡细胞（间质）





上皮性肿瘤（最常见）	浆液性/黏液性囊腺瘤/囊腺癌等
由卵母细胞发生的为**生殖细胞肿瘤**（成熟畸胎瘤为良性） 膜内无鸡胚	畸胎瘤、无性细胞瘤（恶性）、内胚窦瘤/卵黄囊瘤、胚胎性癌、绒毛膜癌（生殖细胞来源的肿瘤多是恶性）
由卵泡细胞发生的为**性索间质肿瘤** 支持一粒卵泡	粒层细胞瘤/颗粒细胞瘤（恶性）、卵泡膜细胞瘤（良性）、支持-间质细胞瘤（主要发生在睾丸、肿瘤分泌雄激素） 靠近生殖细胞一偏恶性　远离生殖细胞一良性

除开卵母都是卵泡细胞

1.上皮性肿瘤举例

浆液性肿瘤（发病率高）	黏液性肿瘤
囊腔内含清亮囊液和实性结节	多个囊腔、内含黏稠囊液和实性结节
乳头多见（恶性者更多）双儒将	乳头少见
累及双侧卵巢多见	累及单侧卵巢多见
恶性即**浆液性囊腺癌**：癌细胞浸润间质、**砂粒体/钙化小体** 又是乳头又是癌（甲状腺乳头状癌） 脑膜瘤也可有砂粒体	恶性即黏液性囊腺癌：癌细胞浸润间质 子宫内膜异型增生VS子宫内膜癌:癌细胞有无浸润子宫内膜间质

①浆液性肿瘤乳头多见 ②必须是癌




图 14-17 卵巢黏液性囊腺瘤
肿瘤表面光滑，包膜完整，由多个大小不一的囊腔组成，其中某些腔内充满富于糖蛋白的黏稠液体。

注意：卵巢黏液性癌可为原发（本节所学，累及单侧卵巢多见）

可为继发（胃肠黏液癌尤其胃印戒细胞癌种植性转移至卵巢，累及双侧卵巢多见）

双侧卵巢的恶性肿瘤首先考虑 **Krukenberg 瘤**（胃癌转移到卵巢）