4.分类

（1）非浸润癌 没有突破基底膜

①**导管原位癌/导管内癌**：其中高级别者核分裂象常见、粉刺样坏死（**粉刺癌**）

恶性程度大一点

一般不出现乳房内肿块

②小叶原位癌：核分裂象**罕见**、癌变间期**长**、多累及**双**侧乳房多个象限

恶性程度不大　特殊

（小这个字中间长、两边有点）ttsx




图 14-25　高级别导管原位癌

导管内癌细胞排列紧密，大小不一，胞质丰富，嗜酸，中央有大片坏死。

（2）浸润癌

从原位癌发展过来不特殊

癌的规律

①浸润癌**非特殊**型：以前称为**浸润性导管癌（最常见）**：巢状等结构、边界不清、间质纤维组织多 特殊:食管癌髓质型纤维组织少软软的

十版改变 ②浸润性小叶癌：由小叶原位癌穿透基膜向间质浸润所致。癌细胞大小一致、核分裂象少见，呈**单行串珠状/列兵样/细条索状排列、或环形排列在正常导管周围（牛眼样/靶环）**。常转移至脑脊液、浆膜表面、卵巢、子宫、骨髓（小孩站一排、围成圈、泡水里玩）

导管

胃肠道癌症晚期发生血道转移经门静脉至肝脏一牛眼征

e.g 心包膜、腹膜、胸膜

③浸润癌**特殊**型：

分化程度高、异型性小

预后较好的类型 （比浸润癌非特殊型预后好） 软软的小实性乳头分泌黏液	**小管癌/高分化腺癌**：大量腺体形成 异型性小 **大量淋巴细胞浸润的髓样癌**：巢状等结构、边界清楚、癌细胞大、间质少（大清软软的） VS浸润性导管癌：巢状等结构、边界不清、间质纤维组织多 **黏液腺癌** **分泌性癌** **实性乳头状癌**
预后较差的类型	**炎性乳癌（预后最差）**、分期T4 浸润性微乳头状癌、富于脂质性癌、高级别化生性癌



5.临床

①**橘皮样变（皮肤水肿）**：阻塞真皮内**淋巴管**

复习：由于淋巴回流受阻导致的组织水肿有丹毒象皮肿、乳腺癌橘皮样变、丝虫病橡皮虫

②**酒窝征（皮肤凹陷）**：侵犯 Cooper/乳房悬**韧带** 一端连在皮肤上面,癌组织侵犯导致韧带收缩变短皮肤局部出现凹陷

③**淋巴转移**最早和最常见（首先至**同侧腋窝**淋巴结）；也易经**椎旁静脉**转移至**骨**、肺、肝、肾上腺、脑 乳腺癌一般肿块不痛,患者不明原因出现胸痛/腰痛警惕发生椎旁静脉系统骨转移

小结：易经椎旁静脉发生骨转移的有乳腺癌、前列腺癌、甲状腺癌、肾癌（甲乳省钱）

位于中线结构易通过椎旁静脉系统转移

④**雌激素受体 ER+**预后较**好**，可**内分泌**治疗；***HER2+***预后较**差**，可**靶向**治疗

串:乳腺癌的内分泌治疗

①绝经前用雌激素受体拮抗剂如他莫昔芬三苯氧胺(吃他三)

②绝经后用芳香化酶抑制剂如阿那曲唑、依西美坦(阿姨)