随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有




图 18-3　结核结节
中央为干酪样坏死，周围为上皮样细胞、朗汉斯巨细胞及淋巴细胞等，右上插图为朗汉斯巨细胞的高倍。

四、肺结核最常见

（一）原发性肺结核

（1）概念：机体初次感染结核杆菌，无特异免疫力（之后在病程中出现）

（2）好发：儿童

以前叫原发综合征

（3）基本病理特征——**原发复合征**（X 线呈**哑铃**影）

通气好

①肺内原发灶（**起始**部位）：**上叶下部、下叶上部近胸膜处**的炎性灶

②结核性**淋巴管炎**

③肺门淋巴结结核：**肺门淋巴结肿大**。多为**单**侧肿大、常伴干酪样坏死

VS 结节病：双肺门淋巴结肿大

（4）主要经**淋巴道或血道**播散（TB 嚣张）

结核杆菌






图 18-4　肺结核原发复合征模式图
右侧肺上叶下部胸膜下见黄白色原发病灶，肺门部见肿大的淋巴结，二者之间以淋巴管炎相连。





小凯笔记自行整理

原发综合征结局

■症状及体征不明显，结核菌素试验阳性

■自然痊愈95%左右（细胞免疫的建立）进行性纤维化和钙化

■恶化　营养不良或传染病的患儿（肺门淋巴结病变继续发展→形成支气管淋巴结结核/粟粒性肺结核）