（二）继发性肺结核

静止原发灶再度活化

1.概念：机体再次感染结核杆菌（**内源复发**为主），有免疫力 感染TB(结核杆菌)≠结核病

再次感染┌外源性
　　└内源性(多见)

VS

原发复合征:没有特异免疫力 一些成人抵抗力强,感染结核杆菌后,TB处于休眠被抑制状态,此时不叫结核病(潜伏在身体里),当机体抵抗力突然低下,静止原发灶再度活化

2.好发：成人，尤其是抵抗力低下者

3.病变特征

①**好发部位：上叶尖后段、下叶背段和后基底段**（勾肩搭背 hou 基友）

右主支气管粗,更易吸进右边,TB是需氧菌,而肺尖氧气多

②病变常从右**肺尖**开始，自上而下主要经**支气管**播散→病变**上重下轻、上旧下新**

下叶血多,免疫细胞多　　已经形成特异免疫力

③病变 ttsx 多局限于肺内

VS

原发性肺结核通过淋巴管,血道播散-没有形成特异免疫力,结核杆菌"嚣张"

④**常伴空洞** 与蜡质有关,蜡质引起的是变态反应

变态反应和免疫反应常常同时存在,此时已经有特异免疫力,所以空洞常见

4.若合并 AIDS

①好发于**下**叶 此时血中免疫细胞↓,所以结核杆菌易入血,而血因重力往下面走

难以建立免疫力

②趋于原发性肺结核：常有肺门、纵隔淋巴结肿大，空洞少见

没有办法限制TB　　此时没有免疫力,就没有变态反应

③病变常累及多个部位：胸膜/心包渗出、粟粒影多见

④**肉芽肿少见** 无免疫无法形成肉芽肿

⑤PPD 常呈**阴**性或弱阳性 蛋白质引起的变态反应

5.继发性肺结核的类型

（1）**局灶**型肺结核（**非**活动性）早期

①好发于**肺尖**，境界清楚的结节（以增生为主）

②提示结核杆菌数量少+机体免疫力强→多无症状

↓ 顺着支气管播散(活动)

（2）**浸润**型肺结核（**最常见的活动性**继发性肺结核）┌纤维组织包绕病变→结核球
　　└病变累及胸膜→结核性胸膜炎

①好发于**肺尖和锁骨下**，境界不清/边缘模糊、密度不均的**云雾状/云絮状影**（以渗出为主），可有薄壁空洞 ┌大量结核杆菌经支气管播散引起肺坏死→干酪性肺炎
　　└空洞经久不愈,引起肺弥漫纤维化→慢纤空

②提示结核杆菌数量多+机体免疫力弱→多有咳嗽、**低热**、盗汗等症状