甚至出现高热

（3）干酪性肺炎（病情危重）

无壁空洞

虫蚀样空洞，可有大叶性实变

VS 大叶性肺炎:绝无空洞

（肺炎链球菌荚膜致病,不会产生毒素）



传染强弱与排菌量有关

痰涂片(+)代表排菌量很大

浸润型肺结核	干酪性肺炎	慢纤空
薄壁	无壁(虫蚀)	厚壁


（4）慢性纤维空洞型肺结核（传染性强的开放性肺结核）

实际上传染性强应该=空洞,而不一定是慢纤空


①好发于上叶的厚壁空洞。ttsx 洞壁分三层：内层（干酪样坏死物+大量结核杆菌）、中层（肉芽组织）、外层（纤维结缔组织）肉芽组织机化过程



图 18-5 慢性纤维空洞型肺结核







②同侧或对侧肺组织可见由支气管播散引起的很多病灶，它们大小不等、上旧下新

上叶大量纤维化

③肺组织严重破坏、广泛纤维化、肺体积缩小变形、肺门抬高、肺纹理呈垂柳样

④可并发慢性肺心病 肺组织纤维化(硬)引起循环阻力↑,继而引起肺动脉高压导致肺心病

（5）结核球/结核瘤

①孤立的境界清楚（纤维包裹）的干酪样坏死灶

②结核球来自:①浸润型肺结核的干酪样坏死灶纤维包裹;②结核空洞引流的支气管阻塞→空洞由干酪样坏死物填充;③多个结核病灶融合





图 18-6 肺结核球





小凯笔记补充

①结核球跟周围性肺癌鉴别
②由于纤维包绕,药物难以到病灶内发挥作用 → 所以临床上一般做手术治疗
③纤维包裹病灶相当于定时炸弹