随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

5.肺外结核

抓规律：肺外结核多继发于肺结核（肠结核、骨结核、肾结核 90%均继发于肺结核）

记特殊：结核性腹膜炎多继发于腹腔内结核灶（肠结核、肠系膜淋巴结结核、输卵管结核）直接蔓延；其它泌尿系结核、男生殖系结核多继发于肾结核



（1）肠结核

①多继发于空洞性肺结核（经口感染-反复咽下含有结核杆菌的痰液）

比较窄,食物在此处停留时间长,接触结核杆菌机会多

②好发于**回盲部**（淋巴组织丰富）

①

③溃疡型多见：肠黏膜**淋巴管呈环形走向**→**环**形溃疡（溃疡长轴与肠长轴**垂直**）

纤维组织明显收缩

→**易致肠梗阻**　　②也可以以增生为主

（2）结核性腹膜炎：**揉面感/柔韧感** 肠结核直接蔓延

结核对腹膜刺激温柔 VS 消化性溃疡穿孔对腹膜刺激强烈

（3）结核性脑膜炎：儿童多见，脑底病变最明显

（4）女性生殖系统结核：以 ttsx **输卵管**结核最常见 直接蔓延导致结核性腹膜炎

（5）淋巴结结核：以**颈**部淋巴结最常见

病变在肾脏,表现在膀胱(含有TB的尿液流到膀胱产生膀胱刺激征)

（6）肾结核：**慢性膀胱刺激征、肾自截** 肾组织出现大量钙化,输尿管也钙化闭塞,没办法继续向下排尿,自己给自己做截流

肾的感觉神经在包膜,肾结核很少累及包膜,因此腰痛不明显



图 18-8 肾结核
肾实质内多数干酪样坏死灶及空洞形成。





活动多　　椎体处是滋养A(终末A没有侧支循环),TB容易聚集

（7）骨与关节结核：**腰椎**结核最常见，**椎体破坏、椎间隙变窄、冷/寒性脓肿** 很多干酪样坏死物、肉芽肿形成

一般脓肿:红肿热痛



