风湿的皮肤病变有增生性和渗出性
结核有增生性和渗出性
伤寒只有增生,胆囊可以储存伤寒,但是胆囊无增生

二、伤寒 急性增生性炎

①全身**单核-巨噬细胞系统增生**：**肝、脾、骨髓、淋巴结**等，以**回肠末端**集合、孤立淋巴小结多见全身冷

没有胆囊(储存伤寒杆菌)

一般肉芽肿都是慢性单核巨噬细胞增生性炎

②**特征为伤寒小结（急性肉芽肿）**：伤寒细胞（吞噬红细胞/伤寒杆菌/细胞碎片的**巨噬细胞**）聚集

特殊

结核结节:巨噬C吞噬结核杆菌
风湿细胞:巨噬C吞噬纤维素样坏死物

VS 结核沿肠黏膜淋巴管环形走向容易引起肠梗阻

③肠道溃疡期：累及**淋巴小结**→**圆形/椭圆形**溃疡（溃疡长轴与肠长轴**平行**→**不引起肠梗阻**）小姐玛丽。可并发肠出血（最常见）、肠穿孔（最严重）

取决于淋巴小结形态

助记

寒 核
最后一笔平行 最后一笔垂直

溃疡深达肌层,穿透粘膜下层(富含血管)

④**蜡样**变性：横纹肌发生**凝固性坏死**，常累及膈肌、腹直肌、股内收肌蜡烛-凝固

⑤脾大、玫瑰疹、中性粒细胞多↓、肥达反应(+)


图 18-10 伤寒髓样肿胀期



抓规律:细菌感染中性粒细胞↑
记特殊:伤寒杆菌感染中性粒细胞↓


图 18-11 细菌性痢疾
结肠黏膜有多处表浅“地图状”溃疡。

三、细菌性痢疾

靠近肛门 累及直肠

①以**直肠和乙状结肠**多见，粘液脓血便、里急后重

纤维蛋白贴在粘膜上

②**假膜性炎（黏膜的纤维素性炎）**

纤维素性炎分子量大,血管通透性大,血管受损严重

③急性：表**浅**不规则**地图状**溃疡→多不引起肠梗阻、肠穿孔

跟痢疾杆菌毒力无关,跟个体自身有关 全身重局部轻


④**中毒性痢疾**：2-7 岁多见（特异体质），全身重而**肠道轻**

eg.感冒流鼻涕一黏膜的浆液性炎

（**卡他性炎**-此为黏膜的**浆液性炎**、**滤泡性炎**）淋巴滤泡增生

血管通透性还没那么高,渗出的是浆液,顺着粘膜往下流叫卡他

浅溃疡 { 细菌性痢疾 / 溃疡性结肠炎


图 18-16 结肠急性阿米巴痢疾的“烧瓶状溃疡”模式图
溃疡深达黏膜下层,口小底大呈烧瓶状,溃疡口周围的黏膜悬覆于溃疡面上。

小结：

ttsx	肠结核	肠伤寒	急性细菌性痢疾	肠阿米巴
炎症	**慢性肉芽肿**	**急性肉芽肿**	**假膜性炎**	**变质性炎**只要看到阿米巴就是变质性炎
好发	**回盲部**	**回肠末端**	**直肠和乙状结肠**	盲肠和升结肠
溃疡	长轴**垂直**肠长轴（肠黏膜**淋巴管环形走向**）	长轴**平行**肠长轴（**淋巴小结**圆形/椭圆形）	表**浅**不规则**地图状**	口小底大的烧瓶状溃疡周围找滋养体 烧瓶装果酱 果酱样便
肠梗阻	**会（最常见）**	**不**	多不	会