注意：

	肠伤寒	急性肠菌痢	消化性溃疡	胃癌
出血	√	√	√	√
穿孔	√	多×	√	√
梗阻	×	多×	√	√

四、血吸虫病

（1）传播条件：带虫卵粪便入水、中间宿主钉螺孳生、人皮肤接触含尾蚴疫水

虫子生长的一个阶段


（2）童虫：引起血管及其周围炎，肺损害最明显同学废

（3）**虫卵**引起的损害最主要最严重（**肉芽肿**）

窦前型

主要沉着于直肠、乙状结肠、肝

IV型变态反应



①急性虫卵结节着急喝酸汤、cao、之后流眼泪

放射状火焰样嗜**酸**性棒状物 虫卵分泌的一些抗原引起的免疫应答	**Hoeppli**
嗜酸性脓肿 状似脓肿	大量嗜**酸**性粒细胞
Charcot-Leyden 结晶	嗜酸性粒细胞崩解产物
机化虫卵 虫卵周围的肉芽组织含大量嗜**酸**性粒细胞 特殊	抓规律记特殊 一般肉芽组织里炎细胞是巨噬细胞
晚期出现 ttsx 类上皮细胞	

急性虫卵结节只是一个过渡状态，只有晚期才有类上皮C，这时才算真正意义上的肉芽肿

②**慢性虫卵结节/假结核结节：类上皮细胞为主，少量异物巨细胞、淋巴细胞、成纤维细胞**

多核巨细胞

凌晨累异 VS 结核结节:凌晨累死

血吸虫

注意：慢性虫卵结节与结核结节的共同点是**常钙化**（学姐钙化）、大量类上皮细胞/上皮样细胞；而它们的不同点是**慢性虫卵结节没有干酪样坏死、淋巴细胞少、含异物巨细胞、毛蚴已死亡** 结核结节内的结核杆菌是有活性的_内源性复发根源

多核巨细胞 ┌ 血吸虫:异物巨细胞
└ 结核:朗汉斯巨细胞

小凯笔记自行整理

结核结节	慢性虫卵结节
常钙化、大量类上皮细胞、成纤维细胞	
大量淋巴细胞 干酪样坏死 结核杆菌仍活 朗汉斯巨细胞	淋巴细胞少 无干酪样坏死 毛蚴死亡 含异物巨细胞

五、性传播疾病

（性传播是主要但非唯一途径）