随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（一）梅毒 本质血管炎

血管周围炎性渗出(浆C渗出)

1.**基本病变：闭塞性动脉内膜炎、小血管周围炎、肉芽肿（特征）** 周围塞车肿么办

胃溃疡溃疡底部
瘢痕组织也有

肉芽肿虽然是基本病变,但是肉芽肿只有三期才有

2.分期



（1）**一期：硬下疳** 会阴周围摸了就传染

（2）**二期**（传染性最大）：**梅毒疹** 随便摸哪都容易传染

（3）**三期**（传染性**最小**）鞍鼻痴呆不想摸了

没有主狭窄　不是结核

①主动脉炎、主闭、主动脉瘤（破裂致猝死）、麻痹性**痴呆**、**脊髓痨**、**马鞍鼻**

主主主延毕咯 mlb

主狭的主要原因是老龄退化,瓣膜出现钙化,梅毒绝少钙化,故不会引起主狭

病理学是形态学科目,B淋巴细胞和浆细胞虽然是同种细胞,但形态不同,要分开阐述

②**树胶样肿/梅毒瘤（肉芽肿）**：**浆细胞和淋巴细胞多见尤其浆细胞恒定出现**（乌梅子酱），

不典型肉芽肿

而**类上皮细胞和朗汉斯巨细胞少见**，**绝少钙化**，伴**凝固性坏死**（可见原有血管壁轮廓）

多核巨细胞

VS 结核:更为彻底的凝固性坏死-干酪样坏死(无轮廓)

注意：朗汉斯巨细胞、异物巨细胞属于多核巨细胞 姐妹们 VS 异甲虫

①**结核、梅毒、麻风**所致肉芽肿的多核巨细胞为**朗汉斯巨细胞**

②**异物（手术缝线/石棉）、慢性虫卵结节、亚甲炎**所致肉芽肿的多核巨细胞为**异物巨细胞**

1 6 1

（二）尖锐湿疣

①**HPV-6、11** 型等

16、18型

与 HPV 密切相关的有尖锐湿疣、宫颈癌、喉癌

感染HPV引起

②**挖空/凹空细胞** 宫颈癌癌前病变_宫颈鳞状上皮内病变(异型增生、挖空C)

③好发于潮湿温暖的粘膜和皮肤交界处如外生殖器、肛门




图 18-14　尖锐湿疣
左上为挖空细胞，左下为 HPV 外壳蛋白免疫组织化学染色阳性。

（三）淋病（最常见的性病）

急性**化脓性炎**，主要累及泌尿、生殖系统

小叶性肺炎、流脑