D.肝纤维化

7.2022N35 A 中毒性细菌性痢疾的肠道病理变化特点是

A.假膜性肠炎

B.滤泡性肠炎

C.溃疡性肠炎

D.出血性肠炎

8.2024N150 X 以肉芽肿为基本病变的疾病有

A.结核病

B.伤寒

C.阿米巴病 变质性炎

D.细菌性痢疾 假膜性炎

答案：7-8 B AB

专题串联·常考溃疡

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

ttsx	好发部位	溃疡特点
肠结核 ⊥	**回盲部**	**环/横**形溃疡，其长轴与肠长轴**垂直** （与肠粘膜**淋巴管走向**一样）
肠伤寒 ‖	**回肠末端**	圆形/椭圆形溃疡，其长轴与肠长轴**平行** （与肠粘膜**淋巴小结形态**一样）
细菌性痢疾	**直肠和乙状结肠**	表**浅**不规则**地图状**溃疡
阿米巴	盲肠和升结肠	口小底大的烧瓶状溃疡
溃疡性结肠炎	**直肠和乙状结肠**	连续性**浅**溃疡 UC连续溃疡浅
克罗恩病	**回肠末端及邻近结肠**	早期鹅口疮样 CD节段鹅卵石 后期**节段**性**纵**行**裂隙状**深溃疡
消化性溃疡	十二指肠**球部前壁** **胃窦小弯**侧	圆形/椭圆形的深溃疡（镜下分 4 层） 黏膜皱襞**放射状**向溃疡集中
胃癌溃疡型	**胃窦小弯**侧	**火山口状**、凹凸不平、黏膜皱襞中断
胃泌素瘤	**十二指肠球部** 最开始承受酸的部位	不典型部位 更有特点 （十二指肠**降部和水平部**、空肠近段、食管远段）出现多发溃疡
应激性溃疡	**胃底胃体**	应激→GC↑→促进胃酸、胃蛋白酶原↑ 壁C 主C

十二指肠降部水平部在胆总管开口处后，本应呈碱性（有胰液胆汁），但是因为胃泌素瘤导致胃酸分泌过多，在原本肠道碱性的地方都会受到胃酸影响发生溃疡

注意：好发于**直肠和乙状结肠**的有细菌性痢疾、血吸虫、溃疡性结肠炎、大肠癌

吸血鬼哎 好发于左半边离肛门近容易便血，只要累及直肠就会有里急后重

小凯笔记自行整理

好发于右侧的消化道疾病：

肠伤寒——回肠下段

克罗恩病——回肠末端

肠结核——回盲部

肠阿米巴病——盲肠，升结肠

上课结巴