随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

注意：

①**经典干扰：肉芽组织 VS 肉芽肿** 可以同时存在(e.g血吸虫)　经典干扰:异型增生 VS 异型性


②**肉芽组织**中的某些成纤维细胞具有平滑肌细胞的收缩功能（称为**肌成纤维细胞**①），可促进**伤口收缩**；而**动脉粥样硬化**中的某些**平滑肌细胞**②有成纤维细胞**产生胶原纤维**的功能，可使**脂纹纤维化形成纤维斑块/纤维帽**（两个不务正业的细胞）

③肉芽组织中的炎细胞以**巨噬**细胞为主，但急性血吸虫虫卵结节周围的肉芽组织以嗜**酸**性粒细胞为主

规律　特殊

串：肝脓肿 CT 见囊性低密度灶（液体密度），增强后明显边缘强化（脓肿壁为肉芽组织）

有丰富的毛细血管



三、创伤愈合

1.骨折愈合




图 2-10　骨折愈合过程模式图

ttsx	肉芽组织	骨小梁
血肿形成	×	×
纤维性骨痂（暂时性骨痂）	√	×
骨性骨痂	√（转分化出成骨细胞）	√（排列紊乱的编织骨）
骨痂改建或再塑	×	√（板层骨）

肉芽组织没有变成瘢痕组织,而是进行转分化变成成骨细胞,形成骨性骨痂,从而达到完全修复