
脂褐素（我吃我自己）吃细胞器

①脂褐素是**自噬溶酶体**内未被彻底消化的细胞器碎片残体，**萎缩**时自噬小体/泡/溶酶体**增多**。正常时神经节细胞、附睾管上皮细胞、睾丸间质细胞有少量脂褐素节节高


平时功能最活跃的细胞一旦需要功能下调,内部丰富细胞器会被降解

②在老年人和**营养耗竭**性患者，**萎缩**的心肌细胞、肝细胞核周围有大量脂褐素，是细胞以往受到自由基脂质过氧化损伤的标志，因此脂褐素称为**消耗性色素**。当多数细胞含有脂褐素时常伴更明显的器官萎缩





心肌内脂褐素颗粒 HE×400
在萎缩的心肌细胞胞质内，尤其是在心肌细胞核的两端存在无数细小的棕黄色颗粒(脂褐素)。



自己干掉自己

（二）肥大

1.实质细胞、组织、器官体积变大，伴功能增强

①此细胞是实质细胞、而非间质

②肥大除了指实质细胞变大以外，也可指实质细胞数量增加（实质细胞增生）

注意：**假性肥大是实质细胞萎缩+间质增生、不属于肥大**（肥大指实质细胞数量增加或体积增大、且肥大会导致功能增强，而萎缩时器官功能下降）

2.分类

①生理性肥大：如妊娠期子宫肥大、运动员 ttsx 肌肉肥大

代偿有一定限度,超过就会导致失代偿

②病理性肥大（多为代偿性）：如高血压时**左**心室心肌细胞向心性肥大、尿路梗阻时膀胱平滑肌肥大

高血压向心性肥大→失代偿离心性肥大

更好排尿



图 1-3 心脏向心性肥大
心脏横断面，示左心室壁及室间隔增厚，乳头肌显著增粗，左心室腔相对较小。




图 1-4 心肌肥大
部分心肌细胞变粗，细胞核不规则且深染，呈代偿性肥大状态。